

## Helbredskeema

<b>1. Går du for tiden til behandling eller kontrol hos læge eller hospital?</b>	Almen sundhed.
<b>2. Har du haft problemer ved lokalbedøvelse?</b>	Adrenalin aktiverer sympatikus og øger fx hjertebanken. Derudover vil en nervøs pt. have forhøjede adrenalin niveauer i kroppen hvorfor man skal være påpasselig med at bruge lokalanalgesi med adrenalin.
<b>3. Har du været langvarig blødning efter tandudtrækning eller ved snitsår?</b>	Relevant ift. ekstraktion eller operation. Man kan overveje om pt. tager antikoagulerende midler som fx NSAID/acetylsalicylsyre.
<b>4. Lider du af astma, høfeber eller nældefeber?</b>	Bivirkninger af astmamedicin er svamp i munden.
<b>5. Ryger du?</b>	Nikotin virker vasokontraherende og der ses typisk mindre blødning hos disse patienter. Derudover er helingen dårligere ifm. PA behandling.
<b>6. Har du haft overfølsomhedsreaktioner (hududslæt, kløe, besvimelse eller andet) overfor</b>	
<b>a. Penicillin eller sulfapræparater?</b>	Penicillinallergi.
<b>b. Anden medicin? (Piller, tabletter, mikstur eller andet)</b>	
<b>c. Andre stoffer? (Jod, kloramin, plaster, metaller)</b>	
<b>7. Har du inden for de sidste 6 måneder fået:</b>	
<b>a. Kortison eller andet steroid (orange kort), blodfortyndende midler (blå kort)?</b>	Steroider hæmmer immunreaktioner.  Ved patienter, der får blodfortyndende midler skal man være opmærksom ved ekstraktioner og operative indgreb.
<b>b. Andre former for medicin, piller, tabletter, indsprøjtninger eller andet?</b>	Tricykliske antidepressiva styrker adrenalins effekt, dog er det sjældent, at depressive patienter bruger denne form for antidepressiva.  Tricykliske antidepressiva giver også mundtørhed
<b>8. Har du eller har du haft følgende sygdomme:</b>	
<b>a. Hjertesygdomme</b>	Ved hjerteklapfejl, især endokarditis, er der behov for profylaktisk antibiotikum 1 time før invasiv behandling (Fx deputation, ekstraktion, operation). Ikke studenteregnet, da pt. skal have antibiotika hver seance (Resistensudvikling). Risikopatienter omfatter: personer med klapprotese, klapsygdom og tidligere endokarditis.  Amlodipin mod angina pectoris og hypertension kan give gingival hyperplasi (sjældenhed).  Calcium antagonist medfører hypotension.
<b>b. Gigtfeber</b>	Tidligere gigtfeber kan give defekter på hjerteklapperne.
<b>c. Forhøjet stofskifte</b>	Øger effekten af adrenalin og dermed sympatikus.
<b>d. Epilepsi</b>	
<b>e. Suktorsyge</b>	Hvis (hæmoglobin) HbA1c $\geq$ 7,0% er blodsukkeret dårligt reguleret, hvilket forårsager fortykkede karvægge og dermed dårlig heling pga. ringe stoftransport over karvæggene.
<b>f. Slidgigt</b>	Ved slidgigt i hænderne anbefales en elektrisk tandbørste.
<b>g. Gulsot</b>	Kan skyldes hepatitis infektion. Obs. smitte
<b>h. Kræft</b>	Immunosuppression som følge af kræftbehandling.

<b>i. Sygdomme i immunforsvaret</b>	Dårligere heling.
<b>j. Andre alvorlige sygdomme</b>	
<b>9. Har du fået strålebehandling på hoved eller hals i forbindelse med behandling af kræft?</b>	Immunosuppression som følge af kræftbehandling.  Strålebehandling i hoved-hals region, kan påvirke spytkirtlerne og kan medføre mundtørhed, nogle gange i alvorlig grad og disse patienter kan have stor caries aktivitet