

FAG: Intern medicin - EKSAMEN	DATO: 17. januar 2019
EMNE	NOTER
Symptomer:	<p>Opstår typisk hvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patienten springer et måltid over • Stor fysisk aktivitet • Får for stor dosis insulin – ubalanceret regulering af insulin beh. <p>De fleste patienter kan mærke når blodsukkeret falder = "føling" – giv sukker!</p> <p>Hurtigt indtrædende hypoglykæmi (symptomer udløses af stress hormoner):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sult • Sved • Rysten • Uro <p>Langsom indtrædende hypoglykæmi (symptomer udløses af centralnervesystemet):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hovedpine • Aggressivitet • Usikker gang • Konfusion • Kramper • Koma <p>Ved vågen pt.: 20g kulhydrat per os</p> <ul style="list-style-type: none"> - et glas juice eller sukkersødet sodavand - druesukker - fx marmelademad <p>ved bevidstløs pt.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Novo Nordisk GlucaGen 1mg hypokit (glucagon) gives i.m, i.v., s.c. kan gentages efter 10-15min (insulin-antagonist) 2. Ved manglende respons: vanlig ABC, og tilkald hjælp. Oprethold beredskab på klinikken
Førstehjælp ved hypoglykæmi	
Symptomer i mundhulen for både type 1 og 2 hvis de er dårligt reguleret:	<ol style="list-style-type: none"> a. Xerostomi b. Spytkirtelforstørrelse c. Svampeinfektion (candidiasis) d. Progressiv PA e. Gingivitis f. Dårligere sårheling (ikke dokumenteret)

FAG: Intern medicin - EKSAMEN	DATO: 17. januar 2019
EMNE	NOTER
<p>Hyperglykæmi:</p> <p>Relevans</p> <p>Behandling:</p>	<p>effekt ved antibiotikaprofylakse)</p> <p>g. Burning mouth</p> <p>h. Profylaktisk antibiotika overvejes ved invasive procedurer.</p> <p>i. Jo dårligere reguleret diabetes jo flere symptomer</p> <ul style="list-style-type: none"> - tørst og polydipsi(sygelig tørst) - synsforstyrrelser - genitalkløe og sår - vægttab - anorexi og kvalme - hudinfektioner <p>Hvis en diabetes pt. ikke har fået stillet diagnosen diabetes og derfor ikke kan absorbere sukker ind i vævene. Glukosen vil trække vandet med ud af kroppen hvorfor der opstår glukosuri(glukose i urin).</p> <p>Profylaktisk antibiotika overvejes ved invasive indgreb – men som udgangspunkt gives det ikke.</p> <ul style="list-style-type: none"> - diæt - tabletbehandling - insulinbeh.
<p><u>Akromegali</u></p> <p>Klinisk:</p> <p>Differentialdiagnostik til mellemrum mellem tænder:</p> <p>Symptomer:</p>	<p>= kæmpevækst</p> <p>Benign tumor på hypofysen, som fører til hypersekretion af væksthormonet GH</p> <p>Rammer kvinder og mænd ligeeligt.</p> <p>Vækst af hænder, fødder og kæber → giver mellemrum mellem tænderne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyste • PA <ul style="list-style-type: none"> - Ledsmerter - Okklusions problemer - Svedtendens - Ringstørrelse og handskestørrelse øges.

FAG: Intern medicin - EKSAMEN	DATO: 17. januar 2019
EMNE	NOTER
<u>Tyreotoksikose (hyperthyroidisme)</u>	= forhøjet stofskifte
<u>Muksødem (hypothyroidisme)</u>	= nedsat stofskifte