

<b>FAG:</b> Intern medicin - EKSAMEN	<b>DATO:</b> 17. januar 2019
<b>EMNE</b>	<b>NOTER</b>
<p><b>Konfusion (Altered Mental Status) AMS</b></p> <p>Betydning for konfus:</p> <p>GCS (glasgow coma score)</p> <p><b>Apopleksi (slagtilfælde):</b></p> <p>Årsager</p>	<p>Ændring af bevidsthed – er et vigtigt og alvorligt symptom som kræver udredning!</p> <p>'Akut konfusion' er et akut psykosyndrom, som ikke er fremkaldt af alkohol- eller medicinabstinens.</p> <p>Tilstanden er karakteriseret ved forstyrrelser i opmærksomhed, hukommelse, orientering, opfattelsesevne, psykomotorisk adfærd og søvn mønster.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ikke nok ilt/oxygen</b> til hjernen (synkope = besvimelse) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rejser sig for hurtigt op</li> <li>b. Vasovagalt anfald</li> <li>c. Kraftig hoste – trykket i thorax stiger og der kommer ikke tryk nok til hjertet</li> <li>d. Hyperventilation</li> </ul> </li> <li>• <b>Ikke nok sukker</b> til hjernen <ul style="list-style-type: none"> <li>a. For meget insulin</li> <li>b. Hypoglykæmi</li> </ul> </li> <li>• <b>Ikke nok blod-strøm</b> til hjernen – cerebrovaskulært anfald: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Trombose</li> <li>b. Blødning</li> <li>c. Hæmorage</li> <li>d. Iskæmi</li> </ul> <p>A,b og c = apopleksi</p> </li> <li>• <b>Skader</b> på hovedet</li> <li>• Epilepsi</li> </ul> <p>- International måde at konstatere konfusion/vågen tilstand</p> <p>Betegnelsen for <b>blødning</b> eller <b>blodprop</b> i hjernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tromboser eller embolier i hjernens arterier (mest hyppige)</li> <li>• Intrakranielle blødninger i hjernesubstansen</li> </ul>

<b>FAG:</b> Intern medicin - EKSAMEN	<b>DATO:</b> 17. januar 2019
<b>EMNE</b>	<b>NOTER</b>
<p>Symptomer:</p> <p><b>HUSK</b> patienter med <b>Apopleksi</b>: er ofte i <b>AK eller ASA</b> behandling → øget blødningstendens!</p> <p>Krampeanfald: (Seizure)</p> <p><b>Epilepsi:</b></p> <p>Status epilepticus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blødninger i subarachnoidalrummet</li> </ul> <p>Afhænger af infarktets lokalisation og udbredelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Ensidig ansigtslammelse</b> (→ evt. dårlig mundhygiejne)</li> <li>➤ Synsforstyrrelser</li> <li>➤ Afasi (de udtrykker sig ikke sprogligt som de tror)</li> <li>➤ Koordinationsforstyrrelse</li> <li>➤ <b>Påvirket bevidsthed</b></li> </ul> <p><b>Infarkt</b> = Lokaliseret vævsdød som følge af iskæmi</p> <p>Generaliserede Partielle (simpel eller kompleks) Hysteriske</p> <p>Man skal <b>ikke gøre noget</b> ved dem, udover at sørge for at de ikke slår sig - <b>lad være med at putte noget ind i munden</b> på dem for at undgå de bider sig i tungen!!</p> <p>Unormal elektrisk impulsaktivitet i hjernen → <b>krampeanfald</b>, problemer med tale, syn, bevidstløshed</p> <p>alvorlig tilstand, epileptiske anfald varer mere end 30min. - under akut epilepsianfald skal man <b>ikke gøre noget</b> med mindre det er status epilepticus så <b>behandles med diazepam + sygehus</b></p> <p>HUSK epilepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stress kan udløse et anfald</li> <li>- Medikament interaktioner med antiepileptika medicin</li> </ul>

<b>FAG:</b> Intern medicin - EKSAMEN	<b>DATO:</b> 17. januar 2019
<b>EMNE</b>	<b>NOTER</b>
Multipel sklerose:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Øget blødningstendens</li> <li>- Gingival hypertrofi(fenytoin)</li> <li>- Xetostomi (carbamezepin)</li> </ul> <p>Ved anfald</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- frie luftveje</li> <li>- beskyt patienten</li> </ul> <p>kronisk, infammatorisk demyeliniserende sygdom i CNS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stress og infektioner kan forværre symptomerne – derfor skal der i perioder med anfald ikke laves større tandlægebehandlinger</li> <li>• Undgå NSAID og steroid</li> <li>• Beta-interferon: stomatitis, xerostomi, candidiasis</li> <li>• Ofte polyfarmaci – og bivirkninger herved</li> </ul>
Parkinson' sygdom	<p>Angiber nervesystemet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- særlig hyppig hos personer 70år +</li> <li>- langsomt udvikling (over år)</li> <li>- starter med rysten i en hånd =&gt; nedsat bevægelser og stivhed i muskler</li> </ul> <p>HUSK parkinson</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- patientens medicin</li> <li>- undgå dopamin antagonist</li> <li>- har kompromitteret oral hygiejne</li> </ul>