

FAG: Intern medicin	DATO: 17. januar 2019
EMNE	NOTER
<p>1. <i>En patient som har fået trukket en tand ud henvender sig 48 timer efter, fordi det stadig sivbløder fra ekstraktionsstedet. Hvad kan man gøre yderligere for at undersøge patienten?</i></p> <p>2. <i>En patient med kendt hæmofili skal have trukket en tand ud. Hvilke forholdsregler skal man tage?</i></p> <p>3. <i>En patient, som er i AK-behandling med Marevan pga. atrieflimren, skal have trukket en tand ud. Hans INR er 3,5. Hvilke forholdsregler skal man tage?</i></p> <p>4. <i>Du undersøge en patient som har henvendt sig, pga. blødninger fra tandkødet. Patientens tandkød er tydeligt hypertrofiert og der er blå mærker på armene. Hvordan skal patienten undersøges yderligere?</i></p>	<p>NSAID kunne godt forårsage sivblødningen Giv en sutur Ikke har forholdt sig i ro</p> <p>System sygdom Spørg om de har tendens til blå mærker</p> <ul style="list-style-type: none"> • OBS for trombocytpani (for få trombocytter) eller andet medicin forbrug som kan forårsage øget blødningstendens (AK-beh.) • Skrumpelever <p>a. Kun mænd som kan få det b. Har øget blødningstendens og de har misdannede led c. Hvis det er en patient som har fået sygdommen for mere end 30 år siden kan de have HIV og hepatitis pga. blodtransfusion. d. Vil ofte tage noget ekstra medicin før ekstraktion, og hvis pt ikke selv ved det, så er de tilknyttet et hæmofili center</p> <p>INR – mål for blødningstid (for normalt individ er den 1, hvis en patient har 2 har de dobbelt så lang blødningstid) De skal normalt ligge mellem 2-3 i INR værdi. INR værdi skal være målt inden for 24 timer, hvis der er risiko for blødning ved behandlingen og den må ikke være mere end 3.</p> <p>Marevan er en vitamin K antagonist og derfor nedsættes koagulationsevnen</p> <p>Kan være en ondartet blodsygdom og de første symptomer kan manifestere sig i munden Eks. Granulocytopeni (har for få granulocytter)</p>

FAG: Intern medicin	DATO: 17. januar 2019
EMNE	NOTER
<p>5. <i>En ældre patient har haft problemer med at synke de seneste 2 måneder. Han har tabt sig. Hvad skal man tænke på?</i></p> <p>6. <i>En overvægtig patient udvikler smerter bag brystbenet som strækker sig om i ryggen, da han bliver lagt ned i tandlægestolen. Hvad skal man overveje?</i></p> <p>7. <i>En 45-årig mand klager over tiltagende mellemrum mellem fortænderne. Hvilken diagnose skal man overveje?</i></p> <p>8. <i>En 42-årig type 1 diabetiker henvender sig pga. tandbyld. Hvilken betydning har denne tilstand på kontrollen af hendes sukkersyge? Hvordan skal hun forholde sig?</i></p> <p>9. <i>Klinikassistent fortæller, at den næste patient på 20 år, ser ud til at være konfus og optræder aggressivt i venteværelset. Du kan se i hans journal at han har diabetes. Da du undersøger ham, sveder han og ser tomt for sig. Hvad er årsagen til hans symptomer? Hvad vil du gøre?</i></p> <p>10. <i>En patient med kendt sklerose har brug for et større broarbejde. Hvilke forholdsregler skal man træffe?</i></p>	<p>Oesøphagus cancer Refluks (sure opstød) Nedsat spytsekretion Kronisk inflammation i tonsillerne</p> <p>Refluks – pga. overvægten kan trykke mavesyre op selvom sphincter virker. Fedt i abdomen vil presse på diaphragma og dermed hjerte og lunger. Lungerne vil ikke kunne presset fedtet væk og der kommer øget intratorakal trykt. – husk derfor at spørge om de kan ligge ned.</p> <p>Parodontose Cyste/tumor Overproduktion af væksthormon, som får knoglerne (kæber, hænder og fødder) til at vokse hos voksne (akromegali)</p> <p>Vigtigt at patienten er velreguleret. Patienten vil have nedsat sårheling. Når man ikke spiser skal man have mindre insulin, når man er stresset skal man have mere.</p> <p>Patienten har hypoglykæmi Giv ham sukker (glukose eller fruktose)</p> <p>Intet problem hvis de er i stabil fase, man skal bare være opmærksom på interaktioner med det medicin de får. Hvis de ikke er stabil fase så vent, for ellers kan sygdommen accelereres pga. stress.</p>

FAG: Intern medicin	DATO: 17. januar 2019
EMNE	NOTER
<p>11. <i>En patient udvikler krampeanfald under tandbehandling. Hvordan skal man håndtere den situation?</i></p> <p>12. <i>En patient på 60 år bliver pludselig konfus under tandbehandling. Hvad er nødvendigt at gøre?</i></p>	<p>Husk at tjekke efter for interaktion, da der som regel altid er noget med epilepsi medicin, som kan interagere med anden medicin.</p> <p>Lig dem ned og sørg for at de ikke slår sig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hypoglykæmi • Vasovagalt anfald – lavt blodtryk og dermed for lidt blod til hjernen • For lidt ilt - fremmedlegeme i halsen, det at blive lagt ned kan give vejrtrækningsproblemer, quenkes ødem • Hyperventilation • Anafylaktisk chok